

Cet article est rédigé par des élèves. Il peut comporter des oublis et imperfections, autant que possible signalés par nos relecteurs dans les notes d'édition.

# Le Comptable

Année 2023 – 2024

Antoine Lemaître, Naomi Bauer, Grégory Provendier, élèves de Seconde et de Première

Établissement : Lycée Léonce Vieljeux, La Rochelle

Enseignant-es : Rachel Biton, Pierre Vederine

Chercheur : Cyrille Ospel, Université de La Rochelle

## Présentation du sujet

- 1) Peut-on déterminer 3 entiers naturels différents deux à deux de 2 chiffres, commençant tous par le même chiffre, et dont la somme est divisible par 2 d'entre eux ?
- 2) Peut-on déterminer 4 entiers naturels différents deux à deux de 3 chiffres, commençant tous par le même chiffre, et dont la somme est divisible par 3 d'entre eux ?

## Pistes de résolution du problème numéro 1

### Décompositions des nombres

a) On note  $N_1 < N_2 < N_3$  les 3 nombres choisis et  $S$  la somme de ces trois nombres.

A-t-on que  $S = N_1 + N_2 + N_3$  est divisible par deux d'entre eux ?

Exemple :  $N_1 = 21$ ;  $N_2 = 23$  et  $N_3 = 26$ . La somme  $S = 21 + 23 + 26 = 70$ . Or 70 n'est divisible ni par 21 (3,333...), ni par 23 (3,043...). Donc ces valeurs de  $N_1, N_2$  et  $N_3$  ne sont pas solutions du problème.

On décompose donc ces nombres selon le schéma suivant :

$$N_1 = 10a + b \text{ avec } a \in [1; 9] \text{ et } b \in [0; 7]$$

On réutilise cette base pour décomposer les nombres  $N_2$  et  $N_3$ , on obtient donc

$$N_2 = 10a + b + m \text{ avec } m \in [1; 8]$$

$$N_3 = 10a + b + n \text{ avec } n \in [2; 9] \text{ et } m < n$$

b) En mettant en équation ces nombres, on s'est rendu compte que cela n'était pas pratique à cause du trop grand nombre d'inconnues. C'est pourquoi on est revenu aux nombres  $N_1, N_2, N_3$  croissants.

### Mise en équations des nombres

a) Pour répondre au problème il faut que  $N_1 + N_2 + N_3$  puisse être divisible par  $N_1, N_2$  ou  $N_3$ .

Tout d'abord si on essaye de diviser par  $N_1$ , on obtient  $N_1/N_1 + (N_2 + N_3)/N_1$ , ce qui est équivalent à  $N_2 + N_3 = N_1 \times k$  (avec  $k$  entier).

Puis, si on essaye ensuite de diviser par  $N_2$ , on obtient  $N_2/N_2 + (N_1 + N_3)/N_2$ , ce qui est équivalent à  $N_1 + N_3 = N_2 \times k'$  (avec  $k'$  entier).

## Ensemble des valeurs possibles de $k$

Lorsqu'on prend la somme de deux nombres distincts compris entre 10 et 19 on obtient au maximum 37. Or  $37 = 3 \times 10 + 7$  donc au maximum trois fois le chiffre des dizaines (pour les autres dizaines c'est deux fois :  $29 + 28 = 57 = 2 \times 20 + 17$ ).

On en déduit que  $k \in [2; 3]$ .

### Les possibilités restantes

- Si  $k' = k = 2$ ,

alors  $N_2 + N_3 = 2N_1$  et  $N_1 + N_3 = 2N_2$ , d'où  $N_2 - N_1 + N_3 - N_3 = 2N_1 - 2N_2$  et  $3N_1 = 3N_2$ . Or  $N_2$  est différent de  $N_1$  donc on arrive à une contradiction.

- Si  $k' = k = 3$ ,

alors  $N_2 + N_3 = 3N_1$  et  $N_1 + N_3 = 3N_2$ , d'où  $N_2 - N_1 + N_3 - N_3 = 3N_1 - 3N_2$  et  $4N_1 = 4N_2$ . Or  $N_2$  est différent de  $N_1$  donc on arrive à la même contradiction.

- Si  $k' = 3$  et  $k = 2$ ,

alors  $N_2 + N_3 = 2N_1$  et  $N_1 + N_3 = 3N_2$ , d'où  $N_2 - N_1 + N_3 - N_3 = 2N_1 - 3N_2$  et  $3N_1 = 4N_2$ . Or  $N_2 > N_1$  donc  $4N_2 > 3N_1$ , donc on arrive à une contradiction.

- Si  $k' = 2$  et  $k = 3$ ,

alors  $N_2 + N_3 = 3N_1$  et  $N_1 + N_3 = 2N_2$ , d'où  $N_2 - N_1 + N_3 - N_3 = 3N_1 - 2N_2$  et  $4N_1 = 3N_2$ .

On cherche donc un multiple commun à 3 et 4 (1) :

Si  $4 \times 12 = 48$  et  $3 \times 16 = 48$ , on a donc  $48 = N_1 + N_2 + N_3$  d'où  $48 = 12 + 16 + N_3$  et  $N_3 = 48 - 12 - 16 = 20$ .

Or  $N_3 < 20$  car tous les nombres doivent avoir le même chiffre des dizaines. On arrive donc une dernière fois à une contradiction.

### Conclusion

Nous venons donc de démontrer que ce problème ne possède pas de solution réelle.

## Pistes de résolution du problème numéro 2

### Décompositions des nombres

On note  $N_1 < N_2 < N_3 < N_4$  les 4 nombres choisis et  $S$  la somme de ces quatre nombres.

Alors  $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$  est divisible par trois d'entre eux.

Exemple :  $N_1 = 214$ ,  $N_2 = 242$ ,  $N_3 = 250$  et  $N_4 = 262$ . La somme  $S = 214 + 242 + 250 + 262 = 968$ .

Or 968 est divisible par 242 (4), mais pas par 250 (3,872), 214 (4,523...) ou 262 (3,694...). Donc ces valeurs de  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  et  $N_4$  ne sont pas solutions du problème.

### Solutions

Cependant, nous avons réussi à trouver une unique solution pour ce problème, que nous conjecturons être la seule (2), avec comme valeurs pour  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  et  $N_4$  :

$$N_1 = 108, N_2 = 117, N_3 = 135 \text{ et } N_4 = 180.$$

En effet, la somme  $S = 108 + 117 + 135 + 180 = 540$ . Or 540 est divisible par 108 (5), par 135 (4), ainsi que par 180 (3).

## Conclusion

Le problème a donc une solution.

### Notes d'édition

**(1)** Ce multiple commun à 3 et 4 est la somme  $S$ , ce qu'on voit en ajoutant  $N_1$  aux deux membres de  $N_2 + N_3 = 3 N_1$ ; comme 3 et 4 sont premiers entre eux,  $S = 4 N_1 = 3 N_2$  doit être un multiple de 12. De plus, on a vu que  $k=3$  n'est possible qu'e si le premier chiffre des trois nombres est égal à 1, et on a alors  $40 \leq 4 N_1 = S = 3 N_2 \leq 57$ . La seule possibilité est  $S = 48$ ,  $N_1 = 48/4 = 12$  et  $N_2 = 48/3 = 16$ .

**(2)** Le lecteur pourra essayer de démontrer cette conjecture. Comme pour le cas de trois nombres de deux chiffres, on peut réduire le nombre de cas à étudier en encadrant les quotients de la somme par les nombres  $N_i$  et en utilisant le fait que ces quotients doivent être tous distincts.