

problème de Syracuse

par Vincent Bonnacorsi, Jean-Marc Lacaze (1°S), Christophe Roblin, Eric Vitasse (Tle S) du Lycée Sud Médoc, au Taillan-Médoc (33).

enseignantes : Carine Burbaud et Dominique Grihon

chercheur : Laurent Habsieger.

— problème de Syracuse

Etude de la suite définie par : $u_{n+1} = u_n/2$ si u_n est pair, $u_{n+1} = 3u_n + 1$ si u_n est impair.

Le sujet.

On part d'un entier n positif. Si n est pair, on le transforme en $n/2$; si n est impair, on le transforme en $3n+1$. Quel est le comportement de cette suite à long terme?

Premières observations.

Si $n = 6$, on obtient la suite : $6 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$.

Si $n = 9$, on obtient : $9 \rightarrow 28 \rightarrow 14 \rightarrow 7 \rightarrow 22 \rightarrow 11 \rightarrow 34 \rightarrow 17 \rightarrow 52 \rightarrow 26 \rightarrow 13 \rightarrow 40 \rightarrow 20 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$.

Pour tous les nombres n dont nous sommes partis (de 1 à 100, puis davantage grâce à un programme sur ordinateur), la suite aboutit toujours à 1.

Nous nous sommes intéressés aussi à la longueur de cette suite que nous notons $L(n)$. Par exemple, $L(6) = 9$. Mis à part les entiers n de la forme 2^p pour lesquels on peut facilement montrer que la longueur vaut $p+1$, nous n'avons pas trouvé de relation entre n et $L(n)$. Pour n compris entre 1 et 26, $L(n)$ varie entre 1 et 24 mais $L(27) = 112$. A ce jour, nous n'avons pas trouvé d'explication à cet écart. Nous avons enfin observé des similitudes de longueurs en prenant certaines valeurs de n .

Nous avons constaté puis démontré que:

$$L(8k+4) = L(8k+5)$$

et

$$L(16k+18) = L(16k+19).$$

Démonstrations de ces deux conjectures.

$$\begin{aligned} 8k+4 &\rightarrow 4k+2 \rightarrow 2k+1 \rightarrow 6k+4 \rightarrow \\ 8k+5 &\rightarrow 24k+16 \rightarrow 12k+8 \rightarrow 6k+4 \rightarrow \end{aligned}$$

Ceci montre qu'en 4 étapes, on retrouve le même nombre, donc :

$$L(8k+4) = L(6k+4) + 3 = L(8k+5)$$

pour k supérieur ou égal à 1.

$$\begin{aligned} 16k+18 &\rightarrow 8k+9 \rightarrow 24k+28 \rightarrow 12k+14 \rightarrow \\ 16k+19 &\rightarrow 48k+58 \rightarrow 24k+29 \rightarrow 72k+88 \rightarrow \\ 36k+44 &\rightarrow 18k+22 \rightarrow \end{aligned}$$

Ceci montre qu'en 6 étapes, on retombe sur le même nombre, donc :

$$L(16k+18) = L(18k+22) + 5 = L(16k+19)$$

pour k supérieur ou égal à 1.

De même, on peut écrire :

$$L(16k+2) = L(16k+3)$$

avec k supérieur ou égal à 1, car :

$$16k+2 \rightarrow 8k+1 \rightarrow 24k+4 \rightarrow 12k+2 \rightarrow 6k+1 \rightarrow 18k+4 \rightarrow$$

$$16k+3 \rightarrow 48k+10 \rightarrow 24k+5 \rightarrow 72k+16 \rightarrow 36k+8 \rightarrow 18k+4 \rightarrow$$

Dans quels cas est-on sûr d'arriver à un nombre inférieur à n ?

- Tout d'abord, voyons quel est l'intérêt de cette question : nous avons montré que si on était sûr que pour tout n , on arrivait à un nombre inférieur à n , alors la suite aboutirait toujours à 1.

Démonstration par récurrence : soit P_n la propriété « la suite débutant par n aboutit à 1 ».

Il est clair que P_1 est vraie.

Supposons que P_1, P_2, \dots, P_{n-1} soient vraies. Alors, **si** l'on est sûr qu'en partant de n on arrivera à un nombre p strictement plus petit que n , l'hypothèse de récurrence s'applique à p et on aboutira alors à 1, et donc P_n est vraie.

- Le problème maintenant est de voir **si** effectivement on aboutit à un nombre plus petit que celui du départ.

Si $n = 4k$: $4k \rightarrow 2k$ qui est inférieur à n .

Si $n = 4k + 2$: $4k+2 \rightarrow 2k+1$ idem.

Si $n = 4k + 1$: $4k+1 \rightarrow 12k+4 \rightarrow 6k+2 \rightarrow 3k+1$ qui est inférieur strictement à n ($k > 0$).

Si $n = 4k + 3$: $4k+3 \rightarrow 12k+10 \rightarrow 6k+5 \rightarrow 18k+16 \rightarrow 9k+8$. La parité de $9k + 8$ n'est pas connue. Il faut donc décomposer à nouveau ce cas suivant les valeurs de k .

A ce jour, nous n'avons rien trouvé de plus.